

DEZE FOLDER IS ONTWIKKELD DOOR
VERLOSKUNDIG SAMENWERKINGSVERBAND SHE

Gynaecologen Treant
Verloskundigenpraktijk FLOW
Verloskundigenpraktijk New life
Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Verloskundigenpraktijk Petit
Verloskundigenpraktijk AKKA
Verloskundigenpraktijk Katja & Jacqueliën
Verloskundigenpraktijk EVE
Verloskundigenpraktijk Lief Leven
Verloskundigenpraktijk Jalad
Verloskundigenpraktijk Volle Maan
Verloskundigenpraktijk Simons
Verloskundigenpraktijk Coevorden



Serotiniteit

*Overdragenheid van de
zwangerschap*

In deze folder vindt u informatie over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid van de zwangerschap. U kunt lezen wat de gevolgen van serotiniteit zijn en welke medische zorg u kunt verwachten.

Uitgerekende datum

De verloskundige of gynaecoloog bepaalt in het begin van de zwangerschap aan de hand van een termijnecho de uitgerekende datum. Deze echo wordt gemaakt tussen de tiende en twaalfde week van de zwangerschap

De meeste vrouwen bevallen niet precies op de uitgerekende datum. Een normale zwangerschap duurt 37 tot 42 weken. Verloskundigen en gynaecologen noemen deze periode van vijf weken ook wel de uitgerekende periode of termijn voor een normale zwangerschap.

Serotiniteit

Als de bevalling twee weken na de uitgerekende datum nog niet op gang is gekomen, spreken we van serotiniteit, de medische term voor overdragenheid. Twee procent van alle zwangerschappen duurt langer dan 42 weken.

Gevolgen

Bij een zwangerschap die langer dan 42 weken duurt, kan er soms sprake zijn van een minder goed werkende placenta (moederkoek) De baby krijgt dan geleidelijk minder voeding. Ook de hoeveelheid vruchtwater wordt langzamerhand minder. Verder is de kans groter dat er ontlasting van de baby (meconium) in het vruchtwater komt. In zeer zeldzame gevallen krijgt de baby te weinig zuurstof en ondervindt daar schade van.

Naar de gynaecoloog

Hoewel de risico's van serotiniteit relatief klein zijn, is het toch goed om problemen vóór te zijn. Dat is de reden dat de verloskundige de zorg bij 42 weken overdraagt aan de gynaecoloog. Deze kan de bevalling inleiden (opwekken met medicijnen), zodat het niet nodig is om langer af te wachten. Tijdens de bevalling wordt de hartfrequentie van de baby geregistreerd. Zijn er aanwijzingen dat de baby problemen heeft tijdens de bevalling, dan kan in het ziekenhuis ingegrepen worden met bijvoorbeeld een kunstverlossing of keizersnede

Controles vanaf 41 weken

Van serotiniteit is dus pas sprake vanaf de 42^e week van de zwangerschap. Toch kunnen er vanaf de 41^e week tekenen zijn dat de placenta minder goed werkt. In dat geval is het beter om de bevalling eerder in te leiden.

Om deze 'risico zwangeren' op te sporen, worden alle zwangerschappen vanaf 41 weken extra gecontroleerd in het ziekenhuis. De extra controles bestaan uit een hartritmerregistratie van de baby (CTG) en een echoscopische meting van de hoeveelheid vruchtwater. Ook wordt aan u gevraagd of u de baby normaal voelt bewegen in uw buik. Alles bij elkaar geeft dit voldoende informatie.

Gaat alles goed, dan blijft u tot 42 weken onder de zorg van uw eigen verloskundige en mag u met uw eigen verloskundige bevallen (thuis of poliklinisch)

Als u niet tot 42 weken wilt wachten kunt u na 41 weken ingeleid worden. Wanneer u niet van uw eerste kindje bevalt, kunnen na 41 weken ook thuis de vliezen gebroken worden en wachten we op een spontaan beloop. Wanneer de weeën niet op gang komen, zullen er in het ziekenhuis weeën opwekkers toegediend worden. De verloskundige zal dan de mogelijkheden met u bespreken.

Bevallen in het ziekenhuis

Bij serotiniteit krijgt u een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. De gynaecoloog is eindverantwoordelijk voor de zorg en neemt in overleg met u de beslissingen. Verloskundigen en verpleegkundigen zullen u begeleiden tijdens de bevalling. De gynaecoloog is aanwezig bij de bevalling als er bijzonderheden zijn.

Na de bevalling

Als de bevalling zonder problemen verloopt, brengt u de kraamperiode thuis door. Wanneer u naar huis kunt hangt af van hoe u zich voelt en hoe de bevalling verlopen is.

Hoe nu verder?

Tijdens de controle in de 40e week van de zwangerschap zal uw eigen verloskundige uw gegevens via Zorgdomein naar het ziekenhuis versturen. U krijgt dan een oproep voor de naderende serotiniteit controle in het ziekenhuis.

Meenemen naar het ziekenhuis

- *Patiënten kaart*
- *Gegevens van de zwangerschap*